

HYPROMELOZA-P®

očné roztokové kvapky

Tento produkt je zdravotnícka pomôcka. Pred použitím si prečítajte tento návod na používanie. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znova prečítali.

Popis produktu

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú očný roztok s prídavkom dexpanthenolu. Očný roztok je naplnený vo viacdávkovej fľaške uzatvorenej uzáverom so závitom, označenej etiketou. Fľaška je balená do papierovej škatuľky spolu s návodom na použitie. 1 ml roztoku obsahuje 20 kvapiek.

Očné zvlhčenie a hydratácia

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú očný roztok, ktorý vytvára dočasný ochranný film na rohovke a spojovke, čím znižuje odparovanie slz a tak zabráňuje ďalšiemu poškodeniu očného povrchu z nedostatku chýbajúcej slznej tekutiny. Prípravok svojím zvlhčujúcim a ochranným účinkom pôsobí ako náhrada pri nedostatočnej tvorbe slz.

Regenerácia povrchu oka

Dexpanthenol použitý ako prídavná látka pomáha urýchľovať regeneráciu povrchových buniek rohovky a spojovky. Prípravok je preto určený aj na epitelizáciu rohovky a spojovky po poranení alebo po operácii oka.

Roztok obsahuje:

Hlavná zložka: Hypromelóza 5 mg v 1 ml

Pomocné látky: dexpanthenol (1 %), benzalkónium-chlorid (0,005 %), chlorid sodný, edetan disodný, čistená voda.

Pomocná látka so známym účinkom: konzervačná prísada benzalkónium-chlorid 0,05 mg v 1 ml (0,005 %), dexpanthenol 10 mg v 1 ml (1 %).

Účel určenia prípravku

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú určené na vytvorenie dočasného ochranného filmu na rohovke oka pri nedostatočnej tvorbe slz, čím zvlhčujú a chránia povrch oka pri stavoch spojených s príznakmi suchého oka a u pacientov s malými eróziami rohovky.

Indikácie

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú určené pre užívateľov:

- so suchými očami rôznej etiológie (keratoconjunctivitis sicca, Sjögrenov syndróm, syndróm počítačového videnia, nositelia kontaktných šošoviek s miernou a strednou formou suchého oka, po operácii oka)
- s malými eróziami rohovky rôznej etiológie (po vpadnutí malých častíc do oka alebo po operácii oka)
- pri nepríjemných pocitoch v očiach (napr. pálení, svrbení, pocite cudzieho telieska) v dôsledku podráždenia spôsobeného vetrom, prachom, cigaretovým dymom, znečisteným vzduchom, kontaktnými šošovkami atď.

Populácia pacientov a určenie užívateľa

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky môžu používať dospelí, mladiství a deti.

Obmedzenia

- deti mladšie ako 1 rok
- tehotné alebo dojčiace ženy

Dávkovanie

Odporúčaná dávka je 1-2 kvapky do spojkového vaku oka 2 až 6-krát denne.

Poučenie pred aplikáciou

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú po otvorení pripravené na podanie do oka. Pacient odskrutkuje ochranný uzáver, mierne zakloní hlavu, obráti fľašku hore dnom a jej stlačením kvapne do dolného spojkového vaku predpísaný počet kvapiek.

Kontraindikácie

HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky, roztok sú kontraindikované:

- u pacientov s alergiou na akúkoľvek látku zdravotníckej pomôcky
- v akútnej fáze poleptania oka až do úplného odstránenia žieravých látok zo spojkového vaku a odstránenie odumretého tkaniva
- u detí mladších ako 1 rok.



Varovanie

- ak ste alergickí na niektorú z uvedených látok alebo konzervačných látok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.
- nepoužívajte tento prípravok, ak si pred prvým otvorením fľašky všimnete, že poistný krúžok uzáveru je poškodený alebo je poškodený obal.
- nepoužívajte tento prípravok po dátume expirácie, aj keď je fľaška stále bezpečne uzatvorená. Dátum expirácie je uvedený na štítku alebo škatuľke pri ikone presýpacích hodín a vzťahuje sa na posledný deň v danom mesiaci. Otvorené balenie nepoužívajte dlhšie ako 28 dní.
- uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

- pri aplikácii prípravku sa kvapkadlo nesmie dotýkať oka ani očného viečka. Po aplikácii je potrebné uzáver pevne zaskrutkovať, aby sa zabránilo prípadnej kontaminácii.

Upozornenie
Nositelia kontaktných šošoviek
Tento prípravok obsahuje konzervačnú látku benzalkónium-chlorid. Mäkké kontaktné šošovky môžu reagovať s benzalkónium-chloridom a môže sa zmeniť farba kontaktných šošoviek. Pred použitím tohto prípravku si vyberte z očí kontaktné šošovky a po aplikácii počkajte 15 minút, kým si vložíte kontaktné šošovky späť.

Iné súčasne používané očné prípravky
Ak sú súčasne s týmto prípravkom používané aj iné očné kvapky alebo očné masti, je potrebné medzi jednotlivými aplikáciami dodržať aspoň päťminútový interval. Očné masti sa majú aplikovať ako posledné.

Vedenie motorových vozidiel a obsluha strojov
Krátko po nakvapkaní prípravku do oka môže prechodne nastať rozmazané videnie. Preto nevedte motorové vozidlá, ani nevykonávajte iné činnosti vyžadujúce si zvýšenú pozornosť, kým sa vám schopnosť vidieť opäť nevráti do normálneho stavu.

Pokiaľ sa ťažkosti, pre ktoré bol prípravok podávaný nezlepšia a pretrvávajú, alebo sa dokonca zhoršia, vyhľadajte svojho očného lekára.

Aby sa znížilo riziko krížovej kontaminácie a prenosu infekcie, obsah fľašky by mala používať len jedna osoba.

Nežiaduce vedľajšie účinky
HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky sú veľmi dobre znášané. Zriedkavo sa po aplikácii môžu vyskytnúť nasledujúce vedľajšie účinky:

- alergická reakcia, ktorá sa môže prejavíť ako príznak lokálneho podráždenia
- lokálne podráždenie (pálenie, svrbenie, štipanie, mierny nepríjemný pocit)
- hyperémia (začervenanie)
- pocit zlepených očných viečok
- dočasné rozmazané videnie.

V prípade výskytu iných závažných reakcií súvisiacich s používaným prípravkom je potrebné ich nahlásiť výrobcovi (neziaduceucinky@unimedpharma.sk) a príslušnému orgánu prostredníctvom národného systému nahlasovania členského štátu, v ktorom ma používateľ sídlo.

Interakcie nie sú doposiaľ známe.

Klinický prínos
HYPROMELOZA-P očné roztokové kvapky pomáhajú zmierniť príznaky suchosti, podráždenia, pálenia, očného diskomfortu, zlepšiť ochorenia očného povrchu a podporuje hojenie.

Pokyny na skladovanie a likvidácia produktu
Uchovávať pri teplote 10 - 25 °C. Uchovávať v pôvodnom obale na ochranu pred svetlom a vlhkosťou.
Nepoužitý prípravok vráťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte zodpovedne v súlade s miestnymi pokynmi do príslušného kontajnera na triedený odpad.

Obsah balenia:
Polyetylénová (LDPE) fľaška s LDPE kvapkadlom, biely polypropylénový (PP) uzáver so závitom a bezpečnostným prúžkom. Plastová fľaška je zabalená do kartónovej škatuľky.

Veľkosť balenia: 1x10 ml

Výrobca:



UNIMED PHARMA spol. s r.o., Oriešková 11, 821 05 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: unimedpharma@unimedpharma.sk
www.unimedpharma.eu

Význam piktogramov na balení

	Výrobca		Číslo šarže
	Dátum výroby		Použiteľné do
	Hranice teploty		Prečítajte si návod na používanie
	Zdravotnícka pomôcka		Nepoužívať ak je obal poškodený a prečítajte si návod na používanie
	Sterilizované pomocou techniky aseptického spracovania		Uchovávať v suchu
	Chrániť pred svetlom		Upozornenie
	Počet kvapiek v 1 ml		Unikátna identifikácia pomôcky

Dátum poslednej revízie textu: Marec 2025

CE 2265



Oriešková 11, 821 05 Bratislava,
Slovenská republika



ver.01